LICLOR 29

Desengordurante clorado concentrado sem espuma

Desengordurante desinfectante para limpeza de circuitos e equipamentos na indústria alimentar. No caso de se utilizar em circuitos de ordenha, é aconselhável combiná-lo alternadamente (nunca ao mesmo tempo) com um detergente ácido para completar as duas limpezas diárias. Produto completamente biodegradável. Grande poder dispersante da dureza e da sujidade, evitando incrustações. Pode ser usado entre 20 e 60 ºC com superfícies de aço inoxidável. Conservar à sombra e de preferência em local fresco. Apto para a indústria alimentícia.

LICLOR 29, cumpre com a norma:

NORMA UNE-EN 13697 Para Bactericidas e Fungicidas na superfícies, na Indústria Alimentícia.
NORMA UNE-EN 14476 a una concentración de 1,5%, con 5 minutos de contacto, como viricida.



DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÂO

Antes de utilizar o produto, ler atenciosamente a etiqueta. A aplicação do produto na indústria alimentícia, deverá ser feita em ausência de alimentos.Serão tomadas todas as medidas necessárias para que os alimentos e utensílios que sejammanipulados nos locais ou instalações tratadas não contenham resíduos de nenhum dos seus ingredientes activos. Não deverá misturar-se com nenhum outro produto químico. Não é compatível com ácidos.

Indústria de engarrafado de bebidas: Em circuitos por recirculação 2% entre 60 - 70ª C deTemperatura. Enchedoras, pasteurizadoras: 3 - 4% à 80º C

Indústria de carnes: Desengordurado geral de superfícies em dissolução entre 1 - 5% dependiendo do nivel da sujeira existir. Aplicação com máquina de pressão, 1% e à temperatura ambiente. Limpeza de armazéns de carne através de lavagem automática por projecção ao 0´5 - 1% e à 60º Cpar tunnel de lavage par projection 0,5-1% et à 60ºC

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido transparente
Cor:	amarelado
Densidade:	1.22 g/cc a 20ºC
pH:	12.5 (1%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

ÁCIDOS NEUTROS ALCALINOS

Tª Inflamação:	N.A.
Viscosidade (cPs, 20ºC):	N.A.
Carência Química de Oxigénio (CQO):	31.88 g/Kg
Teor de Fósforo (P):	4.16 g/Kg
Outros:	N.A.

COMPOSIÇÂO QUÍMICA QUALITATIVA

Hipoclorito de sódio 5%
Hidróxido potássico 8.2%
Excipientes e dissolventes csp 100%

Em caso de ingestão acidental, com o CENTRO DE INFORMAÇÂO ANTI-VENENOS: 808 250 143 NºFAB 63.393

Ed: AA/24
16/10/2024

LICLOR 29

Desengordurante clorado concentrado sem espuma



MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO DE ANÁLISE

Reagentes: Ácido clorídrico (HCl) 0.1N
Tiossulfato de sódio 0,1N

Procedimento: Adicionar 25 mL de tiossulfato de sódio a 10 mL da solução a titular..Agitar bem e aguardar um minuto.Adicionar 2-3 gotas de fenolftaleína..Titular com ácido clorídrico até ao desaparecimento da cor.

Cálculos:

% v/v **LICLOR 29** = mL ácido clorídrico 0,1N gasto x 0.52
% p/p **LICLOR 29**= mL ácido clorídrico 0,1N gasto x 0.64


DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE

Procedimento: Medir a condutividade do banho e subtrair a condutividade da água. O valor dessa subtração será o que usaremos.

Cálculos:

% v/v **LICLOR 29**= Condutividade (mS / cm) x 0,155
% p/p **LICLOR 29** = Condutividade (mS / cm) x 0,19

APRESENTAÇÃO



Recipientes de 12 Kg.
Recipientes de 24 Kg.

Em caso de ingestão acidental, com o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143 Nº FAB 63.393

Ed: AA/24
16/10/2024